

**Комплексная защита картофеля**

Вредный объект	Препарат	Фазы развития растений					
		Клубни	Рост ботвы	Смыкание ботвы	Бутонизация	Цветение	Конец цветения
Колорадский жук (личинки младших возрастов)	Фитоверм, КЭ (10 г/л)	-	-	-	1/2-кратное опрыскивание 0,1% рабочим раствором с интервалом 7-10 дней против личинок II-III возрастов каждого поколения вредителя		
Картофельная моль	Фитоверм, КЭ (10 г/л)	Многократное обмакивание в 0,1% рабочий раствор	-	-	опрыскивание 0,1% рабочим раствором по каждому поколению вредителя		
Бактериозы (черная ножка, бактериальные гнили)	Фитолавин, ВРК	Обработка перед посадкой 0,2% рабочим раствором	2 л/га опрыскивание, расход рабочей жидкости 300 л/га		-	-	2 л/га опрыскивание, расход рабочей жидкости 300 л/га
Вирусная инфекция	Фармайод	Обработка клубней 0,5%-ным рабочим раствором препарата перед посадкой	Опрыскивание в фазу всходов 10-15 см, далее с интервалом 10-14 дней. Опрыскивание: 0,25-0,3 л/га при норме расхода рабочей жидкости 300 л/га. В случае сильной зараженности посадочного материала или высокого риска перезаражения, рекомендуется проведение дополнительных обработок с интервалом 7-10 дней			-	Опрыскивание после окончания цветения 0,25-0,3 л/га при норме расхода рабочей жидкости 300 л/га